

ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ ERECTAFIL 20

Показания к применению

Любые формы расстройства эрекции, не зависимо от этиологического фактора, вызывающего эректильную дисфункцию.

Противопоказания

Сексуальная активность имеет потенциальный риск для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому лечение эректильной дисфункции, в том числе с использованием препарата Erectafil 20, не следует проводить у мужчин с такими заболеваниями сердца, при которых сексуальная активность не рекомендована.

Побочные эффекты

Наиболее часто отмечаемыми нежелательными событиями являются головная боль и диспепсия (11 и 7% случаев, соответственно). Нежелательные события, связанные с приёмом тадалафила, были обычно незначительными или средними по степени выраженности, транзиторными и уменьшались при продолжении применения препарата. Другими обычными нежелательными эффектами являлись боль в спине, миалгия, заложенность носа и "приливы" крови к лицу. Редко - отёк век, боль в глазах, гиперемия конъюнктивы и головокружение.

Способ применения

Каждая софт-таблетка содержит 20 мг действующего вещества – это стандартная дозировка, оптимальная для большинства мужчин. В сутки можно принять 1 таблетку Erectafil 20. Повторно принимать лекарство разрешено не ранее, чем через 24 часа.

Таблетку Erectafil 20 принимают за полчаса до секса. Эрекция появляется не позднее, чем через 20 минут. Алкоголь в разумных количествах не противопоказан. Препарат действует в течение 2 суток, поэтому мужчина сможет провести несколько половых актов – Тадалафил включается в любой момент при активной сексуальной стимуляции.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Запрещено комбинировать Erectafil 20 с альфа-блокаторами, донаторами азота, другими средствами для потенции, включая гомеопатические.