

ИНСТРУКЦИЯ К ПРЕПАРАТУ «SILDALIS»

Показания к применению

Любые эректильные дисфункции, вызванные различной этиологией у мужчин, достигших совершеннолетия.

Противопоказания

Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости к компонентам. Перед приёмом Sildalis необходимо проконсультироваться с врачом тем, кто имеет нарушения зрения в тяжёлых формах, патологию сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек и печени.

Побочные эффекты

- мышечные боли в спине;
- тахикардия;
- нарушение цветового восприятия;
- аллергический ринит;
- головные боли;
- диспепсические расстройства.

Побочные действия носят кратковременный характер. Если негативные эффекты держатся несколько часов, то необходимо обратиться за помощью к врачу.

Способ применения

Рекомендованная доза для первого приёма составляет 60 мг в сутки. При недостаточной эффективности дозировку увеличивают до 120 мг в сутки.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Sildalis плохо сочетается с такими лекарствами, как ритановир, интраконазол, кетоконазол и эритромицин. Нельзя принимать препарат вместе со средствами, понижающими давление и содержащими нитраты.

Передозировка

При передозировке могут наблюдаться ярко выраженные побочные эффекты, которые перечислены в предыдущем разделе. Причиной ее может быть

слишком большая доза препарата. Ни в коем случае нельзя принимать более 120 мг средства. Это максимально допустимая разовая доза в любых случаях. Лишнее количество можно принять по неосторожности, неправильно разделив таблетку или сократив время между двумя приемами. Поэтому при лечении надо быть крайне осторожным.

Если вы заметили симптомы передозировки, немедленно вызывайте врача. Он проведет все необходимое лечение: промывание желудка, очищение крови от токсических веществ, восстановительные процедуры. Кроме того, врач сделает необходимые назначения для дальнейшего лечения.