

Инструкция по приему Дапоксетин Stop Ejac

Лекарственные средства на основе дапоксетина представляют собой округлые таблетки покрытие оболочкой двояковыпуклой формы синего цвета (иногда встречаются препараты светло-зеленого цвета, в данном случае все зависит от компании производителя). Активным действующим веществом данных препаратов является гипохлорид дапоксетина. Он представляет собой синтетическое твердое вещество, которое выполняет функцию активного захвата серотонина и является селективным ингибитором.

Препараты на основе дапоксетина выпускаются в разных дозировках. Современные фармакологические компании предлагают лекарственные средства с содержанием активного компонента 30, 60 и 90 мг. Терапевтический эффект препаратов основан на обратном захвате серотонина, благодаря чему в коре головного мозга блокируются некоторые рецепторы, позволяющие задержать эякуляцию. Препараты на основе дапоксетина быстро усваиваются организмом, именно по этой причине положительный эффект наблюдается уже через 30-60 минут после приема лекарственного средства.

Дапоксетин также быстро включается в метаболизм, а продукты его распада легко выводятся из организма через почки. Согласно результатам проведенных исследований уже через 2-3 часа после приема препарат уровень дапоксетина резко начинает снижаться.

Показания к применению

Преждевременное семяизвержение. Согласно статистике, примерно 30% мужчин в возрасте старше 18 лет страдают от преждевременного семяизвержения. Подобного рода нарушения могут крайне негативно сказываться на психо-эмоциональном состоянии. Такая проблема легко корректируется с помощью препаратов на основе дапоксетина. Изначально такие лекарственные средства использовались для лечения депрессий и подавленного психического состояния. И лишь некоторое время спустя такие препараты стали применять для коррекции половой функции.

При правильно выбранной дозировке препараты на основе дапоксетина корректируют половую функцию и способны задерживать эякуляцию. Благодаря ингибированию серотонина, длительность полового акта продлевается примерно в 3-4 раза. Регулярный длительный прием препарата нормализует половую активность, не оказывая влияние на другие органы и ткани.

Грамотно подобранная терапия также способствует нормализации психо-эмоционального состояния.

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать только по назначению врача! Только специалисты с высшим медицинским образованием могут включить препараты на основе дапоксетина в схему лечения после полного медицинского обследования. Это делается с целью установления причины преждевременной эякуляции (иногда ингибиторы серотонина просто на просто могут оказаться неэффективными). Схему лечения и дозировку должен определять специалист.

Препарат принимать внутрь обильно запивая водой не более одного раза в сутки. Поскольку эффект от приема лекарственного средства наступает не сразу, принимать его следует за 30-60 минут до предполагаемого полового акта. Препарат принимается вне зависимости от приема пищи. *Внимание!* В период приема препарата следует избегать употребление алкогольных напитков, поскольку они могут снизить действие активного компонента и спровоцировать появление побочных эффектов.

После приема препарата эффект длится в течение 10-15 часов, после чего продукты распада препарата выводятся из организма через почки.

При использовании лекарственных препаратов на основе дапоксетина стоит регулярно посещать лечащего врача, который будет отслеживать любые изменения, происходящие в организме.

Противопоказания к применению

Лекарственные средства на основе дапоксетина имеют относительно небольшой список противопоказаний. Так, стоит воздержаться от приема препарат в случае индивидуальной непереносимости к основным компонентам препарата – в частности лактозе и дапоксетину (это может спровоцировать нежелательную аллергическую реакцию). Лекарственные средства данной фармакологической группы запрещено принимать при аритмии, острой сердечной недостаточности и гипотонии. Метаболизм активных компонентов препаратов происходит в печени. Именно по этой причине препарат запрещен пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.

Относительные противопоказания

Дапоксетин стоит с осторожностью принимать при проблемах с артериальным давлением. Специалисты рекомендуют перед каждым приемом препарата измерять кровяное давление (оно не должно быть слишком низким, или же слишком высоким). Лекарственные средства на основе дапоксетина также стоит с осторожностью принимать пациентам, которые ранее страдали психо – соматическими расстройствами.

К относительным противопоказаниям также относятся: заболевания почек, нарушения свертываемости крови, эпилепсия.

Побочные эффекты

Побочные эффекты при приеме препаратов на основе дапоксетина развиваются в исключительно редких случаях. При приеме препаратов некоторые пациенты могут жаловаться на:

- Тошноту (в некоторых случаях она может быть спровоцирована передозировкой лекарственного препарата);
- Расстройства со стороны желудочно–кишечного тракта (диарея);
- Зуд и жжение кожных покровов, а также повышение чувствительности кожи;
- Повышенная активность нервной системы, которая выражается в тревожности, апатии, бессоннице;

При возникновении побочных эффектов необходимо незамедлительно обратиться к врачу!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Дапоксетин плохо взаимодействует с препаратами, предназначенными для лечения шизофрении и прочих психических расстройств, а также некоторыми антибиотиками. Препараты для коррекции биполярных расстройств также относятся к группе риска (как правило, это препараты на основе лития).

К группе лекарственных средств, которые запрещено принимать совместно с дапоксетином относятся:

- сильнодействующие обезболивающие средства (в частности, Трамадол)
- ингибиторы моноаминоксидазы в любых формах и дозировках (предшествующие 2 недели)
- лекарственные средства, содержащие нитраты, нитриты, литий
- любые антидепрессанты
- тиоридазин
- противовирусные препараты (например, сакинавир, ритонавир)
- имидазолы (итра- и кетоконазол),
- ингибиторы цитохромов, трамадола
- наркотические вещества (амфетамины, кетамин, ЛСД)

Относительно опасные лекарственные средства

К относительно опасным лекарственным средствам относятся препараты, которые назначаются для лечения мигрени, а также группа фитопрепаратов, содержащие в своем составе зверобой. *Именно по этой причине перед тем, как начать лечение препаратами на основе дапоксетина, следует ознакомить специалиста с полным списком принимаемых средств.* Это позволит избежать возникновения побочных эффектов и аллергических реакций.

Полезная информация

Дапоксетин является уникальным препаратом быстрого действия. Эффективность от приема препарата наблюдается в более чем 80% случаев у мужчин в возрасте от 18 лет и старше. На сегодняшний день именно это лекарственное средство пользуется огромной популярностью. Первый препарат на основе дапоксетина был запатентован в 2004 году. Лекарственные средства данной фармакологической группы увеличивают длительность полового акта в несколько раз и способствуют нормализации психо-эмоционального состояния. Побочные эффекты наблюдаются менее чем у 10% пациентов.