

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUHAGRA

Сухагра (Suhagra) – лекарственное средство для лечения эректильной дисфункции и помогает восстановить нормальную потенцию у мужчин.

Сухагра - индийский препарат, аналогом известного лекарства Силденафил и оригинальной Виагры. Сухагра отличается отличными свойствами воздействия на мужскую потенцию, имеет незначительные побочные эффекты, а также доступную цену. Сухагра не влияет на либидо мужчины и для его воздействия на эрекцию необходимо сексуальное возбуждение. Основной действующий компонент препарата – Силденафил. Если нарушение эрекции вызвано рядом внутренних проблем с работой органов малого таза, влияние препарата на эрекцию будет немного ниже, или будет короче время его эффекта. Препарат не влияет на репродуктивную функцию, не меняет состав спермы и не вызывает привыкания.

Прием препарата помогает восстановить эректильную функцию и восстановить потенцию. Сухагра (suhagra) помогает расслабить мышцы кровеносных сосудов члена. Это приводит к улучшению притока крови к половому органу. Благодаря этому возобновляется эрекция. Эффект от приема виагры будет только при наличии сексуального возбуждения. Сухагра (suhagra) не лечит основных проблем с потенцией и не убирает причины ее появления. Ее действие рассчитано только на появление здоровой эрекции.

Показания к применению

Препарат Сухагра предназначен для лечения эректильной дисфункции, импотенции, слабой эрекции.

Способ применения

Рекомендованная суточная доза – 1 таблетка Сухагра (100 мг препарата). Принимать внутрь, за 30-60 минут до полового акта. Превышать указанную дозировку не рекомендуется. При необходимости дозировка может быть изменена (возможны колебания суточной дозы от 25 до 100 мг).

Побочные действия

Препарат Сухагра в ряде случаев вызывает следующие побочные действия:

- насморк и ощущение заложенности носа;
- диарея;
- расстройство желудка;
- головные боли;
- реакции, вызванные аллергией на силденафил.

Противопоказания

Сухагра противопоказана к приему в следующих случаях:

- нарушения функции печени или почек;
- присутствуют нарушения или болезни зрительного аппарата;
- инсульт;
- аллергия на активный компонент (в данном случае силденафил);
- сердечно-сосудистые нарушения и заболевания (в том числе, отклонения от нормы АД, стенокардия и др.);

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат Сухагра способен взаимодействовать с рифампицином, циметидином, эритромицином, рядом препаратов для лечения СПИДа и ВИЧ-инфекции, а также средств от повышенного артериального давления.

Передозировка

Прием большого количества препарата Сухагра может привести к усилению вышеуказанных побочных эффектов. Рекомендуется симптоматическое лечение.

Условия хранения

Срок годности препарата Сухагра составляет 2 года с даты изготовления. Для хранения следует выбрать место с комнатной температурой (от 15 до 30 градусов по Цельсию). Хранить вдали от детей.

Форма выпуска

Сухагра - таблетки. В упаковке по 4, 8 и 12 таблеток.

Состав

Препарат Сухагра содержит: Цитрат Силденафила 100 мг.

Основные параметры

Название: СУХАГРА (SUHAGRA)

Код АТХ: G04BE03 - Сильденафил