

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUPER ACTIVE

## Показания к применению

**Сиалис Super Active** предназначен для лечения нарушений эректильной функции (эрекции) у мужчин, проявляющейся в не достижении или не сохранении эрекции члена, достаточной, для совершения полноценного полового акта.

## Способ применения

Примите препарат примерно за 35 минут до полового акта и запейте его небольшим количеством воды.

## Дозировка

Допускается применение не более одной капсулы в сутки (20 мг)

## Противопоказания

- Нельзя принимать препарат совместно с препаратами, которые содержат любые нитраты;
- Нельзя принимать препарат лицам до 18 лет;
- При наличии сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних трех месяцев (90 дней), возникновение приступа стенокардии во время половой близости, нестабильная стенокардия, неконтролируемая аритмия, хроническая сердечная недостаточность (2-4 классов по классификации NYHA), ишемический инсульт в последние 6 месяцев, артериальная гипотензия (АД меньше 90/50 мм рт. ст.), неконтролируемая артериальная гипертензия;
- Одновременный прием с лекарствами, которые предназначены для лечения эректильной дисфункции, а также доксазозина;
- Потеря зрения из-за неартериальной передней ишемической невропатии зрительного нерва;
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюко-галактозная мальабсорбация;
- Частый прием (больше 2-х раз в неделю) пациентами с хронической почечной недостаточностью (КК меньше 30 мл/мин);

## С осторожностью необходимо принимать:

- Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (так как нет данных о применении **Сиалис SuperActiveplusy** этой категории людей);

- Пациентам, принимающим альфа1-адреноблокаторы (одновременный прием может привести к симптоматической артериальной гипотензии);
- Пациентам, у которых есть предрасположенность к приапизму (лейкемия, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия);
- Пациентам, у которых есть анатомическая деформация полового органа (болезнь Пейрони, угловое искривление, кавернозный фиброз);
- Вместе с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (саквинавир, ритонавир, итраконазол, эритромицин, кетоконазол,);
- С гипотензивными препаратами.

## **Побочные действия**

### **Редко возникающие побочные эффекты:**

- нарушение полей зрения,
- желудочковые нарушения ритма,
- нестабильная стенокардия,
- носовое кровотечение,
- крапивница,
- длительная эрекция,
- обморок,
- мигрень,
- эпилептический припадок.

### **Нечасто возникающие побочные явления:**

- реакции гиперчувствительности,
- нечеткость зрительного восприятия,
- ощущение сердцебиения,
- тахикардия,
- снижение АД (у пациентов, которые уже принимали гипотензивные средства),
- повышение АД,
- заложенность носа,
- одышка,
- сыпь.

### **Часто возникающие побочные эффекты от приема препарата:**

- головокружение,
- диспепсия,
- боль в спине,
- миалгия.

### **Форма выпуска**

Препарат выпускается в следующих лекарственных формах:

- Сиалис – таблетки (дозировка 20 мг)
- Сиалис софт – таблетки для рассасывания под языком (дозировка 20 мг)
- Сиалис Super Active Plus – капсулы со сверхбыстрым периодом активации (дозировка 20 мг)