

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SUPER TADARISE

Основные действующие вещества – Дапоксетин 60 мг и Тадалафил 20 мг

Показания к применению

Препарат **Супер Тадарайз** предназначен для лечения преждевременной эякуляции (раннего семяизвержения) и лечения нарушений эректильной функции у мужчин.

Способ применения

Примите препарат примерно за 70-90 минут до полового акта и запейте его небольшим количеством воды. Прием жирной пищи не отразится на эффективности препарата. Не рекомендуется применять **Супер Тадарайз** при употреблении алкогольных напитков.

Дозировка

Суточная доза препарата - не более 1 таблетки.

Противопоказания:

Нельзя принимать препарат:

- При наличии сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних трех месяцев (90 дней), возникновение приступа стенокардии во время половой близости, нестабильная стенокардия, неконтролируемая аритмия, хроническая сердечная недостаточность (2-4 классов по классификации NYHA), ишемический инсульт в последние 6 месяцев, артериальная гипотензия (АД меньше 90/50 мм рт. ст.), неконтролируемая артериальная гипертензия;
- При одновременном приеме с лекарствами, которые предназначены для лечения эректильной дисфункции, а также доксазозина;
- При потере зрения из-за неартериальной передней ишемической невропатии зрительного нерва;
- При непереносимости лактозы, дефицита лактазы, глюко-галактозной мальабсорбации;
- При аллергии на Дапоксетин и/или Тадалафил;
- При циррозе печени (серьезной болезни печени);
- Нельзя принимать препарат лицам до 18 лет;

С осторожностью необходимо принимать:

- Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (так как нет данных о применении **Тадалафила** у этой категории людей);
- Пациентам, принимающим альфа1-адреноблокаторы (одновременный прием может привести к симптоматической артериальной гипотензии);
- Пациентам, у которых есть предрасположенность к приапизму (лейкемия, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия);
- Пациентам, у которых есть анатомическая деформация полового органа (болезнь Пейрони, угловое искривление, кавернозный фиброз);
- Вместе с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (саквинавир, ритонавир, итраконазол, эритромицин, кетоконазол,);
- С гипотензивными препаратами.

Нельзя принимать Супер Тадарайз с любыми из следующих препаратов:

- Антидепрессанты;
- Препараты, применяемые при лечении шизофрении;
- Препараты для лечения биполярного расстройства (Керри Катона);
- Linezolid– антибиотик;
- Триптофан – снотворное;
- Зверобой – фитотерапия;
- Трамадол – сильное болеутоляющее;
- Препараты, применяемые для лечения мигрени;
- Препараты, которые содержат любые нитриты.

Вам нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Супер Тадарайз, если:

- У Вас были когда-нибудь расстройства психического порядка;
- У Вас проблемы свертывания крови, болезни почек, эпилепсия или головокружение, низкое кровяное давление.

Возможные побочные действия

- Тошнота;
- Головная боль;
- Диарея;
- Головокружение;

- Диспепсия;
- Сыпь;
- Отдышка;
- Повышение АД
- Снижение АД (у пациентов, которые уже принимали гипотензивные средства);
- Тахикардия;
- Ощущение сердцебиения;
- Нечеткость зрительного восприятия;
- Заложенность носа.