

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ TADADEL 40**

## **Инструкция по применению таблеток**

Принимать Тададел разрешено всем мужчинам начиная, с 18 лет.

Курс приема – не установлен.

Применение таблеток зависит от сексуальной активности индивидуально каждого человека.

Суточная дозировка препарата не должна превышать больше 1 шт.

Препарат можно запивать любыми охлажденными напитками за исключением спиртного.

Действие препарата наступает исключительно во время интимной близости.

В день его применения запрещено употреблять антидепрессанты, болеутоляющие лекарства и снотворное.

## **Показания к приему**

Частичная и полная импотенция, эректильная дисфункция, вялость эрекции и снижение её качества на фоне стрессов, усталости, недосыпания и ведения малоподвижного образа жизни.

## **Побочные действия**

В случае передозировки препарата может наблюдаться головокружение, тошнота, апатия, иногда аллергическая реакция в виде незначительного покраснения некоторых участков кожи. Нужно отметить, все перечисленные симптомы являются кратковременными и проходят практически сразу, как только, действующее вещество препарата покидает организм.

## **Противопоказания**

Сердечнососудистая недостаточность и порок сердца, после инсультное состояние и подозрения на инфаркт, онкологические заболевания, язва желудка, цирроз, ишемическая болезнь сердца и выраженные признаки гипертонии.