

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ TADADEL SOFT**

## **Показания к применению**

Расстройства эрекции независимо от этиологии у лиц старше 18 лет.

## **Противопоказания**

Нельзя употреблять мужчинам моложе 18 лет с имеющейся высокой чувствительностью к любым ингредиентам препарата. Кроме того, строго запрещено употреблять средство совместно с лекарствами, в состав которых входят органические нитраты или донаторы азота. С осторожностью необходим прием средства в случае наличия в анамнезе инфарктов или инсультов, в течение последних 6 мес, сердечная недостаточность, аритмии и прочие хронические заболевания.

## **Побочные эффекты**

При проведении многочисленных клинических испытаний, проводимых в течение нескольких лет, были выявлены лишь стандартные проявления побочных действий, характерные для любого лекарственного средства. Основные это головная боль и диспепсические явления, так же встречалась локальная боль в мышцах спины и аллергические ринит.

## **Способ применения**

Драже необходимо употреблять за 10-15 минут до предполагаемого интима. Препарат для сублингвального употребления, можно сочетать средство с небольшими дозами алкоголя и обильным приёмом пищи. После употребления средства можно совершать половые акты в течение последующих 34-36 часов.

## **Взаимодействие с другими группами препаратов**

Активное вещество Tadadel Soft 20 Тадалафил прекрасно взаимодействует с большинством различных групп препаратов, категорически запрещён одновременный приём препарата с лекарствами, содержащими органические нитраты. Тадалафил способен быстро усилить гипотензивное действие нитратов, что может привести к коллапсу. Повысить активность самого тадалафила способны сильные противовирусные средства и антациды.