

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ VOLKENO

Показания к применению

Лекарственное средство Volkeno-20 результативнее обычной формы Левитры, поэтому его следует принимать мужчинам старше 18 лет страдающими тяжёлыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или тем, у кого удалена предстательная железа.

Противопоказания

Препарат имеет стандартный набор противопоказаний характерный для всей группы препаратов. Строгими ограничениями к приёму следует считать тяжёлые расстройства в функционировании основных органов человека, таких как сердце, почки и печень, особенно в стадии декомпенсации. Онкологические заболевания крови, тяжёлые формы анемии и язвенная болезнь, осложнённая массивным кровотечением.

Побочные эффекты

Самыми типичными негативными проявлениями в результате употребления Volkeno-20 считаются головная боль с явлениями головокружения, в редких случаях возможны обморочные состояния. Небольшой процент мужчин, использовавших препарат отмечали покраснение лица и шеи и затруднение носового дыхания. В редких случаях наблюдались диспепсические явления, вплоть до поноса. Однако все эти проявления наблюдались не более чем в 5-7% случаев, что считается стандартным значением, характерным для любого лекарственного средства.

Способ применения

Употреблять Volkeno-20 следует не более одной таблетки в сутки примерно за 25-30 минут до полового контакта. Эффект от препарата длится до 12 часов. На положительное действие Volkeno-20 не оказывает отрицательного влияния небольшие дозы алкоголя и приём пищи.

Взаимодействие с другими группами препаратов

Volkeno-20, как и другие группы препаратов для усиления потенции недопустимо использовать совместно с нитратами. Плохо сочетается препарат и с ритонавиром, кетоконазолом и адреноблокаторами.